

ABECÉ DE LA  
**PRESCRIPCIÓN,  
DISPENSACIÓN  
Y USO DE  
MORFINA**

*Información para pacientes*



# FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

---

**Indrid Rosario Narvárez Castro**  
Directora (E)

**Maryam Natali Colina Murillo**  
Coordinadora GIT Medicamentos del Estado

**Hilary Andrea Gómez Guerra**  
Coordinadora del Proyecto de Inversión “Incremento de la disponibilidad de medicamentos monopolio del Estado para los pacientes en Colombia Nacional”.

**Julieth Fernanda Contreras García**  
Redacción y corrección de estilo

**Fredy Ernesto Dulcey Cuta**  
Diseño editorial

**Junio de 2023**

## TABLA DE CONTENIDO

---

|           |  |
|-----------|--|
| <b>04</b> | <b>Parte I.</b> Prescripción de Morfina  |
| <b>06</b> | <b>Parte II.</b> Dispensación de Morfina |
| <b>07</b> | <b>Parte III.</b> Uso de Morfina         |
| <b>11</b> | <b>Parte IV.</b> Desecho de Morfina      |
| <b>12</b> | Glosario                                 |

# PARTE I. PRESCRIPCIÓN DE MORFINA

## ¿Por qué le prescriben este medicamento?

Para aliviar el dolor moderado a severo.

¡Recuerde!

**Sólo el médico puede prescribirle Morfina** para los usos que se describen aquí. Bajo ninguna circunstancia debe automedicarse.



»»» Solución inyectable 10 mg/mL  
»»» Solución inyectable 50 mg/5 mL

Imagen de referencia

## ¿Qué debe notificar al médico si le prescriben este medicamento?

Si tiene o alguna vez ha tenido:

- Obstrucción intestinal.
- Convulsiones.
- Dificultad para tragar.
- Hipertrofia prostática (agrandamiento de la glándula reproductiva masculina).
- Problemas urinarios.
- Presión sanguínea baja.
- Enfermedad de Addison.
- Enfermedad en el hígado, los riñones, el páncreas, la tiroides, el corazón o la vesícula.
- Enfermedad en los pulmones.

## ¿Cuáles son las formas farmacéuticas disponibles?



»»» Solución oral 3%

Imagen de referencia

- Enfermedades mentales.
- Embarazo o planea estarlo.
- Posparto (amamantando bebé).

¡Tenga en cuenta!

También debe reportar al médico todo medicamento, vitamina, suplemento nutricional o producto natural que esté ingiriendo al momento de recibir la prescripción de Morfina.

## ¿En qué casos no debería tomar el medicamento?

- Si es alérgico a la Morfina o a cualquiera de sus componentes.
- Si tiene problemas respiratorios.
- Si tiene problemas intestinales.

## PARTE II.

# DISPENSACIÓN DE MORFINA

### ¿Cómo solicitar el medicamento a la Empresa Prestadora de Salud (EPS)?

Morfina es un medicamento de control especial, lo cual significa que tiene riesgo de generar dependencia o uso indebido. Por ello, solo es distribuido por droguerías y farmacias autorizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) o por los Fondos Rotatorios de Estupefacientes (FRE) en cada departamento.

Las siguientes recomendaciones evitarán reprocesos al momento de solicitarlo:

- Revisar la fórmula médica y verificar que los datos estén diligenciados correctamente, sin tachones ni enmendaduras.
- Reclamar el medicamento dentro de los 15 días posteriores a la expedición de la fórmula médica.
- La prescripción del medicamento se hará en una fórmula médica especial. Deben entregarle una original y dos copias.
- Al recibir el medicamento deben entregarle una copia de la fórmula médica para que sepa cómo tomarlo.

- Al momento de reclamar el medicamento, debe presentar el documento de identidad del paciente, a saber: para menores de edad, la tarjeta de identidad o el registro civil y para adultos, la cédula.


### De ser necesario, ¿se puede adquirir el medicamento de forma particular?

Sí, siempre y cuando la prescripción esté realizada en el Recetario Oficial o fórmula institucional (para Bogotá y Cundinamarca) y el establecimiento distribuidor esté autorizado por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) o el Fondo Rotatorio de Estupefacientes (FRE) competente.



## PARTE III. USO DE MORFINA

**Una vez formulado por el médico, ¿qué debe tener en cuenta al ingerir el medicamento?**



- Seguir atentamente las instrucciones del médico y tomar Morfina según lo indicado.
- En caso de tener alguna inquietud sobre la dosificación, consulte a su médico.

**Si olvida ingerir una dosis, ¿qué puede hacer?**



- Esperar a la siguiente hora programada para retomar.
- No tomar el doble de la dosis para compensar la olvidada.


**¡Recuerde!**

No suspender el uso de la Morfina sin hablar con el médico o equipo de soporte de cuidados paliativos. Si interrumpe el uso del medicamento de manera repentina, podría experimentar síntomas de abstinencia como inquietud, ojos llorosos, secreción nasal, bostezos, irritabilidad, ansiedad, sudoración, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido, escalofríos, dolor de espalda, muscular o de articulaciones, náuseas, vómito, pérdida de apetito, diarrea, calambres estomacales, debilidad, ritmo cardíaco rápido o respiración rápida.

## ¿Qué precauciones tener durante el uso del medicamento?

- Evitar el consumo de bebidas y medicamentos que contengan alcohol, además de otros depresores del Sistema Nervioso Central como benzodiazepinas y sedantes. Esto aumenta el riesgo de que se desarrollen problemas respiratorios serios relacionados al uso de la Morfina, los cuales pueden poner en riesgo la vida.
- Este medicamento puede causar estreñimiento por lo que se recomienda tener una dieta rica en fibra (nueces o almendras, lentejas, arvejas, frijoles, avena, arroz, trigo integral, zanahoria, lechuga, espinacas, manzanas, plátanos, duraznos, mandarinas, peras).
- Este medicamento puede ocasionar vértigo, mareo y desmayo al ponerse de pie muy rápido tras estar acostado. Para evitarlo, tenga presente levantarse despacio y mantener los pies apoyados en el suelo durante unos minutos.
- Este medicamento puede ocasionar somnolencia. No conduzca vehículos ni opere maquinaria hasta que sepa qué tanto le afecta.
- Durante las consultas con médicos u odontólogos debe informar el uso de Morfina.

- No se debe recomendar ni ofrecer Morfina a otras personas, ya que podría representar un riesgo para su salud.
- Es importante cumplir con todas las citas de control y las pruebas de laboratorio que ordene el médico.



## Si al recibir el medicamento se siente diferente, ¿cuándo debe consultar al médico?



Como todos los medicamentos, la Morfina puede producir reacciones adversas, aunque no todas las personas las presenten. Los siguientes síntomas pueden indicar que se está presentando un efecto secundario y, por lo tanto, debe consultar a su médico de forma inmediata:

- Color azul o púrpura en la piel.
- Ritmo cardíaco lento o rápido.
- Convulsiones.
- Somnolencia extrema.
- Dolor en el pecho.
- Fiebre.
- Ronchas en la piel o sarpullido.
- Picazón.
- Inflamación de los ojos, el rostro, la boca, los labios o la garganta.
- Ronquera.
- Dificultad para respirar o tragar.
- Agitación.
- Nerviosismo.
- Cambios de humor.
- Confusión.
- Dificultad o dolor al orinar.
- Dolor de estómago y calambres.
- Diarrea.
- Pérdida de apetito o de peso.
- Boca seca.

¡Tenga en cuenta!

Toda sospecha de reacción adversa, tanto las previamente descritas como cualquier otra no contemplada, debe ser reportada al médico que le atiende. También debe comunicarla al correo electrónico [fne@minsalud.gov.co](mailto:fne@minsalud.gov.co).

## ¿Cómo detectar y prevenir situaciones de dependencia, tolerancia y abuso de este medicamento?

Este medicamento puede producir dependencia (no poder dejar de tomarlo) y tolerancia (ya no es efectivo), generar adicción y sobredosis. Por ello es muy

importante tomar con exactitud la dosis formulada por el médico y evitar que personas que no lo necesiten lo tomen (especialmente los niños).

El medicamento se debe guardar en un lugar seguro, de difícil acceso y donde se pueda vigilar de forma constante. Ante cualquier síntoma de los que se describirán a continuación, diríjase de inmediato al servicio de urgencias más cercano:

- La dependencia física se manifiesta con los mismos signos del síndrome de abstinencia, una vez se ha suspendido de forma abrupta el medicamento. Entre ellos se encuentran:

- ▶ Ansiedad.
- ▶ Dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido.
- ▶ Irritabilidad.
- ▶ Debilidad.
- ▶ Pupilas dilatadas.
- ▶ Ojos llorosos.
- ▶ Sudoración.
- ▶ Escalofríos.
- ▶ Dolor muscular.
- ▶ Secreción nasal.
- ▶ Bostezos.
- ▶ Calambres estomacales.
- ▶ Náuseas.
- ▶ Disminución del apetito.
- ▶ Vómito.
- ▶ Diarrea.

- La tolerancia se sospecha cuando la condición de salud no empeora, pero aun así se requieren dosis cada vez más elevadas del medicamento.

- El abuso se manifiesta a través del comportamiento de “búsqueda de drogas”, el cual incluye:
  - ▶ Pérdida repetida o manipulación de las prescripciones.
  - ▶ Negativa a proporcionar registros médicos o información de contacto de otros médicos tratantes.
  - ▶ Negativa a someterse a pruebas o exámenes toxicológicos.

## ¿Cuáles son los signos y qué hacer en caso de intoxicación?

Si el paciente ingiere más Morfina de la prescrita en la fórmula médica, debe hablar de inmediato con el médico o llamar a una ambulancia, ya que puede requerir atención de urgencia. Tenga claro cuánto medicamento se ha tomado y llévelo con usted.

Las personas con sobredosis pueden presentar:

- Dificultad para respirar, la cual puede conducir a la pérdida del conocimiento o incluso a la muerte.
- Somnolencia.
- Mareo.
- Piel fría y húmeda.
- Pupilas pequeñas.
- Hipotensión.
- Coloración azul de las uñas, los labios y los párpados.
- Paro cardíaco.



## PARTE IV.

# DESECHO DE MORFINA

### ¿Cómo almacenar el medicamento y desechar los sobrantes o residuos?

El medicamento se debe almacenar en un lugar fresco, protegido de la luz, en su empaque original y fuera del alcance de los niños.

No se deben almacenar sobrantes del medicamento. En caso de haber terminado el tratamiento, de que lo hayan cambiado o de que el paciente fallezca, los sobrantes deberán ser devueltos al lugar en donde fue entregado el medicamento o depositarlos en un contenedor de **Punto Azul**, los cuales están ubicados en farmacias y droguerías. No se deben desechar las tabletas en la caneca ni en el sanitario, pues esto contamina el medio ambiente.



# GLOSARIO

---

- **Abuso:** uso indebido de drogas o medicamentos con fines no médicos.
- **Fondos Rotatorios de Estupefacientes:** oficina de la Secretaría, Instituto o Dirección de Salud a nivel departamental, que garantiza la disponibilidad de medicamentos del Estado y ejerce vigilancia, seguimiento y control a las entidades públicas, privadas y personas naturales que procesan, manipulan, sintetizan, fabrican, distribuyen, venden, consumen y dispensan sustancias sometidas a fiscalización.
- **Medicamentos de control especial:** son aquellos que producen efectos mediatos e inmediatos de dependencia psíquica o física en el ser humano.
- **Medicamento monopolio del Estado:** son aquellos de posesión exclusiva del Estado.
- **Recetario Oficial:** documento oficial autorizado por la entidad competente, el cual es utilizado los prescriptores de salud para la formulación de los medicamentos de control especial y monopolio del Estado. Es de carácter personal e intransferible.

*El presente documento es resultado del trabajo en conjunto entre el Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado y el Proyecto de Inversión “Incremento de la disponibilidad de medicamentos monopolio del Estado para los pacientes en Colombia nacional” del FNE.*

[fne.minsalud.gov.co](https://fne.minsalud.gov.co)

